

DET score

Discolouration Erosion Tissue overgrowth

ツールの使用方法

1. ストーマ周囲皮膚(粘膜を除く)を調べ、3つの領域の説明に従って評価する
各領域の最高得点:

- ・3点: 障害部位のサイズ
- ・2点: 障害部位の重症度

2. 障害部位のサイズを評価し、
右の表をもとに点数をつける

各領域の重症度は、
定義とガイドの写真を用いて評価する

- ・範囲得点が0の場合、
その領域の重症度得点は自動的に0点となる

障害部位範囲	得点
障害なし	0
< 25%	1
25-50%	2
> 50%	3

*面積は「面板に覆われた
ストーマ周囲皮膚の面積」と
定義される
(例: 25%未満とは、面板の
接着範囲の25%未満である)

領域1: 色調変化

色調変化のある範囲のサイズを推定する(0 - 3点)

- ・全く色調変化がない場合は、健全皮膚とし、合計得点は0とする
- ・色調変化がある場合は、重症度を評価する(1点または2点)

領域2: びらん

びらん範囲のサイズを推定する(0 - 3点)

得点が0の場合は、領域3に進む

- ・びらんがある場合は、重症度を評価する(1点または2点)

領域3: 組織過形成

組織過形成範囲のサイズを推定する(0 - 3点)

得点が0の場合は、合計得点を算出する

組織過形成がある場合は、重症度を評価する(1点または2点)

3. 合計得点の算出

- ・合計得点は、各領域の得点を足し合わせて算出する
- ・患者の皮膚を評価するときは毎回、
各得点の採点方法の説明を読んでください

領域1: 色調変化 (Discolouration)

色調変化の範囲 (びらん部位含む)

健全皮膚(肉眼的変化と
表皮損傷がない)

「色調変化の範囲」の得点が
0ならば、合計得点は0とする

得点 = 0

面板に覆われた皮膚の
25%未満

重症度を評価してください

得点 = 1

面板に覆われた皮膚の
25% - 50%

重症度を評価してください

得点 = 2

面板に覆われた皮膚の
50%を超える

重症度を評価してください

得点 = 3

色調変化の重症度

ストーマ周囲皮膚の
軽度の発赤または
その他の色調変化



例

得点 = 1

深い赤または
高度に浸軟した皮膚で、
さらなる合併症の可能性が
ある



例

得点 = 2



領域2: びらん (Erosion)

びらの範囲

びらん / 表皮剥離がない

「びらの範囲」の得点が
0の場合、領域2の得点は
0+0とする

得点 = 0

面板に覆われた皮膚の
25%未満

重症度を評価してください

得点 = 1

面板に覆われた皮膚の
25% - 50%

重症度を評価してください

得点 = 2

面板に覆われた皮膚の
50%を超える

重症度を評価してください

得点 = 3

びらの重症度

皮膚表層(表皮)の損傷



得点 = 1

真皮の損傷により
過度の湿潤や出血を
引き起こしている



得点 = 2

領域3: 組織過形成 (Tissue overgrowth)

組織過形成の範囲

組織過形成がない

「組織過形成の範囲」の得点が
0の場合、領域3の得点は
0+0とする

得点 = 0

面板に覆われた皮膚の
25%未満

重症度を評価してください

得点 = 1

面板に覆われた皮膚の
25% - 50%

重症度を評価してください

得点 = 2

面板に覆われた皮膚の
50%を超える

重症度を評価してください

得点 = 3

組織過形成の重症度

面板の装着を妨げる
組織過形成



得点 = 1

面板の装着を妨げ、
出血と / または痛みを
引き起こす組織過形成



得点 = 2



合計得点